

Comprendre l'asthme provoqué
par l'inflammation de type 2 :

ce que vous devez
savoir pour contribuer
à la prise en charge
de l'état de santé
de votre enfant



POUR LES PARENTS ET LES AIDANTS
D'ENFANTS ÂGÉS DE PLUS DE 6 ANS

Repensez
l'asthme *de votre
enfant*

On vit parfois de mauvaises journées

Courir, jouer, s'amuser. C'est ça, être un enfant. Mais si votre enfant est asthmatique, il peut avoir des difficultés à participer. Cela signifie peut-être que pour votre famille, la « normale » est un peu différente, avec un ensemble supplémentaire de signaux et de déclencheurs qui vous maintiennent en état d'alerte, essayant de prévenir la prochaine urgence liée à l'asthme.

L'asthme de votre enfant lui pose problème?

POSEZ-VOUS LES BONNES QUESTIONS SUR L'ASTHME DE VOTRE ENFANT, S'IL :

- Présente des symptômes diurnes (p. ex., toux, respiration sifflante, serrement de poitrine, essoufflement) plus de 4X par semaine
- Présente des symptômes nocturnes plus d'1X par semaine
- Limite les activités susceptibles de déclencher une attaque
- Prend fréquemment un médicament de secours contre l'asthme

Si l'un des énoncés ci-dessus s'applique à votre enfant, il est important de savoir qu'il existe des options de traitement. La première étape consiste à discuter avec le médecin de votre enfant.




La science évolue. Nos connaissances aussi.

Dans une étude américaine menée auprès d'enfants et d'adultes se déclarant atteints d'asthme, 85 % des enfants asthmatiques souffraient d'une inflammation chronique sous-jacente ayant provoqué une réponse allergique systémique.

C'est ce qu'on appelle l'**inflammation de type 2**.

Le système immunitaire de votre enfant réagit de façon excessive à des déclencheurs courants tels que la poussière et le pollen. L'inflammation peut également être à l'origine d'affections autres que l'asthme, notamment l'eczéma et les allergies alimentaires.



DANS UNE ÉTUDE AMÉRICAINE PORTANT SUR DES ENFANTS ET DES ADULTES SE DÉCLARANT ATTEINTS D'ASTHME,

85 % DES ENFANTS ASTHMATIQUES PRÉSENTAIENT UNE INFLAMMATION DE TYPE 2



Discutez-en à nouveau

Maintenant que vous avez pris conscience de l'inflammation de type 2, discutez avec le médecin de votre enfant ou le spécialiste de l'asthme du rôle que l'inflammation de type 2 peut jouer dans l'asthme de votre enfant, ainsi que des options de traitement qui peuvent aider à soulager les symptômes de l'asthme de votre enfant.



Guide de discussion

RÉPONDEZ À CES QUESTIONS EN CONCERTATION AVEC VOTRE ENFANT ET UTILISEZ-LES POUR ENTAMER LA DISCUSSION AVEC SON MÉDECIN.

Lorsque vous et votre famille avez une meilleure compréhension de l'asthme de votre enfant, son médecin peut se faire une meilleure idée de son affection.

1. Votre enfant présente-t-il des symptômes d'asthme* diurnes importants plus de 4X par semaine? Oui Non
2. Votre enfant présente-t-il des symptômes d'asthme* nocturnes importants plus d'1X par semaine? Oui Non
3. Votre enfant a-t-il souvent besoin de prendre un médicament à soulagement rapide? Oui Non
4. Les déclencheurs de l'asthme de votre enfant ont-ils tendance à changer ou à s'aggraver? Oui Non
5. Votre enfant évite-t-il les activités physiques comme la course à pied et les sports actifs? Oui Non
6. Votre enfant manque-t-il des activités avec ses amis chaque semaine en raison de son asthme? Oui Non
7. Votre enfant a-t-il tendance à s'attrister du fait qu'il ne peut pas participer à des activités avec ses amis? Oui Non
8. Est-ce que vous ou votre enfant vous demandez combien de temps il aura de l'asthme? Oui Non

Vous pouvez poser ces questions lorsque vous consultez le médecin de votre enfant.

* Les symptômes de l'asthme comprennent la toux, les sifflements respiratoires, le serrement de poitrine et l'essoufflement.

Utilisez le guide de discussion à la page suivante pour vous aider à entamer une conversation.

Repensez l'asthme *de votre enfant*

Parlez à votre spécialiste de l'asthme de l'inflammation de type 2.



Présenté par une compagnie pharmaceutique de premier plan.

MAT-CA 2200265F

